

I. 基本情報

患者ID @PATIENTID  
 生年月日 @PATIENTBIRTH3  
 患者氏名 @PATIENTNAME  
 性別 @PATIENTSEXN  
 年齢 @PATIENTAGEFORMATTED

BEP療法(縦隔腫瘍)プロトコル (every 3 weeks)  
 day1・2・3・4・5・9・16・day22  
 CDDP(シスプラチン) 20mg/m<sup>2</sup> ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ next  
 BLM(ブレオ) 30mg/body ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ in→  
 VP-16(ベプシド) 100mg/m<sup>2</sup> ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

<疾患名>  
縦隔腫瘍  
その他の胚細胞腫瘍  
 告知 あり なし

<前コースの化学療法開始日> 年 月 日  
 <前コースの投与量>  
 シスプラチン mg  
 ブレオ mg  
 ベプシド mg

II. 化学療法実施過程

\* 投与日当日のチェック事項 (記載のない場合はDr. に確認を行った後、薬局3689に連絡する)

薬剤名	規格	数量	day1	day2	day3	day4	day5	day9	day16
1) ソルデム3A (持続点滴メイン:2時間)	500mL	×1B	<input type="checkbox"/>						
2) プロイメンド注 デキサート 生食	150mg 3.3mg/1mL 100mL	×1V ×3A ×1B	<input type="checkbox"/>						
3) パロノセトロン点滴バッグ (持続点滴側管:0.5時間)	0.75mg/50mL	×1B	<input type="checkbox"/>						
3) デキサート注 生食	3.3mg/1mL 100mL	×3A ×1B		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4) 生食 (持続点滴メイン:ルート確保用)	100mL	×1B						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) シスプラチン シスプラチン シスプラチン 生食	50mg/100mL 25mg/50mL 10mg/20mL 500mL	×( )V ×( )V ×( )V ×1B	<input type="checkbox"/>						
6) メイロン注 生食	20mL 1000mL	×2A ×1B	<input type="checkbox"/>						
7) ブレオ ブレオ 生食	15mg/V 5mg/V 100mL	×( )V ×( )V ×1B		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8) ベプシド 生食	100mg/V 500mL	×( )V ×1B	<input type="checkbox"/>						
9) 生食 (持続点滴側管:全開でフラッシュ用)	50mL	×1B	<input type="checkbox"/>						

III. 化学療法剤投与量算出

<CDDP・BLM・VP-16投与量>  
前コースと投与量同じ(2コース目以降のみ)  
 身長( cm) 体重( Kg)  
 体表面積( m<sup>2</sup>)  
 CDDP(シスプラチン)投与量 ( mg/body)  
 = 20mg/m<sup>2</sup> × 体表面積( m<sup>2</sup>) × ( %)  
 BLM(ブレオ)投与量 ( mg/body)  
 = 30mg/body × ( %)  
 VP-16(ベプシド)投与量 ( mg/body)  
 = 100mg/m<sup>2</sup> × 体表面積( m<sup>2</sup>) × ( %)

<備考欄>  
 ・ブレオ:総投与量は、BEP療法にあつては、360mg以下とする。(ただし、300mgを超えた場合、間質性肺炎又は肺線維症等の肺症状の発現率が 高まる可能性がある)  
 ・ベプシド:DEHPフリーの専用ルートで投与すること  
 →JMS輸液セット:PVCフリーで可(上記条件を満たす)  
 ・本レジメンは原則最大4コース

主治医 薬剤師 薬剤師

\* Dr. が二重線の枠内を記入して  
 開始前日10:30までに薬局へ提出してください。